

جدول معیارهای تشخیص بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

( R Swanepoel ,JH Mynhardt Harvey - ۱۹۸۷)

چنانچه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود مورد به عنوان مورد محتمل CCH F تلقی شده و تحت درمان قرار می گیرد.

بیشتر از یک هفته	کمتر از یک هفته	سابقه تماس با عفونت ( یکی از موارد )	۱-
۲	۳	گزش کنه، یا له کردن کنه با دست بدون پوشش ( بدون دستکش یا حفاظ )	
۲	۳	تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهای دامها یا حیوانات بیمار	
۲	۳	تماس مستقیم با خون، ترشحات با مواد دفعی بیمار تایید شده یا محتمل CCHF ( شامل ورود سوزن آلوده به بدن )	
۱	۲	اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دامها یا کنه وجود داشته، اما بروز یک تماس خاص تصادفی را نمی توان مشخص نمود.	
		نشانه ها و علائم :	۲-
۱		شروع ناگهانی	
۱		تب بیشتر از ۳۸ درجه سانتی گراد حداقل برای یک بار	
۱		سردرد شدید	
۱		درد عضلانی	
۱		حالت تهوع با بدون استفراغ	
۳		تمایل به خونریزی : راش پستی، اکیموز، خونریزی از بینی، استفراغ خونی، هماتوری، ملنا	
		یافته های آزمایشگاهی در طی ۵ روز اول بیماری :	۳-
۱		لکوپنی کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب یل لکو سیتوز بیشتر از ۹۰۰۰ در میلی لیتر مکعب	
۱		ترمبو سیتوپنی ( پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی میتر مکعب)	
۲		( پلاکت کمتر از ۱۰۰۰۰ در میلی متر مکعب)	
۱		یا کاهش ۵۰٪ گلبولهای سفید یا پلاکت ها در طی ۳ روز	
۱		PT غیر طبیعی	
۱		PTT غیر طبیعی	
-		افزایش ترانس آمینازها	
۱		اسپاراتات آمینو ترانس فراز (AST) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر	
۱		آلانین آمینو ترانس فراز (ALT) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر	

	نشانه ها و علائم :
۱	شروع ناگهانی
۱	تب بیشتر از ۳۸ درجه سانتی گراد حداقل برای یک بار
۱	سر درد شدید
۱	درد عضلانی
۱	حالت تهوع با بدون استفراغ
۳	تمایل به خونریزی : راش پستی، اکیموز، خونریزی از بینی، استفراغ خونی، هماتوری، ملنا